

Cukrová repa



BBCH 21 - 23 (3 listy - 6 listov)



1 l/ha



1 l/ha

BBCH 41 - 45 (10 -15 dní po 1.aplikácii)



1 l/ha



1 l/ha

BBCH 23 - 41
(od 6 listov - po zapojenie porastu)



1 l/ha

BBCH

01

11 - 13

21

22

23 - 27

43

90

V prvej fáze len na riedke, nevyrovnané a zle vzchádzajúce porasty

FORSOL EXPANDER alebo **FORSOL HUMINER** (dávka **1 l/ha**) - od 3 do 6 listov - zvýšenie príjmu N.

V druhej fáze

FORSOL GREENER - nutný dostatok vlhky - (dávka **1 l/ha** je možné ju rozdeliť na dve aplikácie po **0,5 l/ha**) - od 6 listov do 20. júna - zvýšenie koncentrácie chlorofylu, zväčšenie listov, spomalenie starnutia starších listov, zvýšenie príjmu N, zosilnenie porastu a vytvorenie predpokladu k navýšeniu výnosu

FORSOL EXPANDER (dávka **1 l/ha**) - 10 až 15 dní po aplikácii FORSOL GREENER - zosilnenie porastu, zväčšenie veľkosti buliev, mierne zvýšenie cukornatosti, zvýšenie odolnosti k suchu.

V tretej fáze

FORSOL FRUITER (dávka **1 l/ha**) - neskorá letná aplikácia v júli pre udržanie vody v rastlinách v období sucha, zvýšenie obsahu cukru.

Doporučená aplikácia podľa stavu a kondície porastov, je možná aj jednotlivá aplikácia podľa vegetačných fáz podľa toho, čo chceme najviac ovplyvniť.



www.forsol.sk

info@forsol.sk

FORSOL, s.r.o.
Kasárenská 9
911 05 Trenčín

Ing. Stanislav Jánošík +421 915 317 030, +421 911 317 030, janosik@forsol.sk
Lenka Gallová +421 905 401 032, +421 911 401 034, gallova@forsol.sk
Ing. Daniela Opálená, +421 918 478 851, +421 903 284 329, opalena@forsol.sk