



V prvej fáze na lepšie vzhádzanie rastlín (jačmeň aj pšenica)

FORSOL HUMINER (dávka od **0,5 l/ha**) - až do začiatku odnožovania - tvorba koreňov, zvýšenie výkonu fotosyntézy, zvýšenie odolnosti rastlín voči stresu. Vhodná je aplikácia na porasty pred príchodom prudkého ochladenia alebo obdobia sucha. Vo vyšších dávkach môže regenerovať pôdy.

V druhej fáze na lepšie odnoženie rastlín (jačmeň aj pšenica)

FORSOL RADIXER (na slabo odnožujúce odrody a v príuškoch dávka do **0,4 l/ha**; na veľmi dobre odnožujúce odrody dávka **0,5 l/ha**) - koniec odnožovania po 1.kolienko - zosilnenie a vyrovnanie hlavných odnoží, potlačenie najslabších odnoží.

V tretej fáze na zlepšenie kvality produkcie

Jačmeň FORSOL FRUITER (dávka od **0,5 l/ha**) - od stĺpkovania do začiatku mliečnej zrelosti - najoptimálnejší čas aplikácie na vlajkový list spolu s fungicídom a 50% dávkou superzrnáča (napr. SILWET) - zníženie obsahu NL, zvýšenie HTS, odolnosť voči stresom (hlavne sucho) - **sladovnícka kvalita**

Pšenica FORSOL FORWET (dávka od **0,25 l/ha**) - od stĺpkovania do začiatku mliečnej zrelosti - najoptimálnejší čas aplikácie na vlajkový list spolu s fungicídom a 50% dávkou superzrnáča (napr. SILWET) - zvýšenie obsahu NL, zvýšenie príjmu N, odolnosť voči stresom (hlavne sucho) - **potravinárska kvalita**.

Doporučená aplikácia podľa stavu a kondície porastov, je možná aj jednotlivá aplikácia podľa vegetačných fáz podľa toho, čo chceme najviac ovplyvniť.

